



אלאדין

علاء الدين ALADIN

תרכיז רחוף SC



אלאדין קוטל חרקים

אחסון:

אחסן את אלאדין באריזתו המקורית במחסן געול לחומרי הדברה, הרחק משיש יום של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. יש להרחיק ממזון אדם ובעלי חיים.

טיפול בחומר שנשפך:

תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הנו כפסולת מסוכנת. יש לכסות בחול או בנוסרת, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות רקות:

יש לשטוף את האריזה היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מיכל המרסס, נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.

עזרה ראשונה:

במקרה של מגע **בעיניים** או **בעור**, יש לשטוף עם מים זורמים במשך 15 דקות לפחות. במקרה של **בליעה** או **שאיפה** יש לפנות לרופא ולהציג תווית זו.

מידע לרופא:

במקרה הרעלה נא להתקשר למרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות טל. **04-7771900**

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס:

בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים:

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. תשטיפים שמכילים דטרגנט יש לסלק בשיטת טיהור או פינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: אחרי הריסוס יש להתרחץ במים וסבון ולהחליף בגדים. יש לכבס את הבגדים בנפרד, אין ללבוש בגדים שלא כובסו.

מועד כניסה מחדש:

ניתן להיכנס לשטח המטופל לאחר 12 שעות.

קוטל חרקים להדברת ציקדות במטעים וגפן, צרעת השקד, קמחית הגפן ופסילת האגס

מכיל: Clothianidin בריכוז 250 גרם לליטר
דרגת רעילות: IV התכשיר מסוכן | מס' או"ם: 3082

קוטל חרקים	4A	קבוצה
------------	----	-------

קרא את התווית בעיון לפני השימוש

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי للاستخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

תכולה: 1 ליטר

רישיון האגף להגנת הצומח:
4644/הר"צ/2024

מס' אצווה ותאריך תפוגה
מוטבע ע"ג האריזה.

תאריך עידכון התווית: 10.2024



המשווק: **תרוסיס בע"מ**
ת.ד. 2630 פ"ת
טל: 03-9784100

היצרן ובעל הרישיון: **דור.קי פיתוח ושווק בע"מ**
ת.ד. 232 סג ציונה
טל: 08-9333474

Dor.Ky P&O Ltd
דור.קי פיתוח ושווק בע"מ
WWW.DORKY.CO.IL



פעילות של דבורים, חל איסור מוחלט ליישום תכשיר זה, יש להימנע מרחף לנידולים ועשבים פורחים סמוכים. התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים עם השפעות ממושכות, מנע זרימה ורוחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

התכשיר עלול לזהם מי תהום. אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:
(א) מבטלה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים;
(ב) מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים;
(ג) מחיפה קרית עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3-ק"מ מזרחה מקו הים;
לא נכללות באיסור זה חלקות בהן: שיעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר, או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.

הכנת התרסיס:
יש לנער היטב את מיכל התכשיר לפני השימוש. מודדים את הכמות הדרושה של אלאדין ומערבבים עם מעט מים, שופכים בהדרגה למיכל הריסוס המלא במחצית מכמות המים הדרושה, תוך כדי בחישת המערבל, ומסופים את יתרת המים.

אופן היישום: המיזון כמפורט בטבלה. היישום ייעשה כטיפול מניעה או כטיפול נגובה. במידה וניתנים מספר יישומים עוקבים להדברת המזיק יש להקפיד על החלפת מנגוני הדברה בין יישום ליישום, ולא להשתמש ברצף בתכשירים שונים מקבוצת הניאוניקוטואידים.

הגידול	המזיק	ריכוז בריסוס	מינון בהגמעה	נפח תרסיס (ליטר לדונם)	ימי המתנה ²
אגס	פסילת האגס	0.1%-0.2% ¹		100-200	
אפרסק, נקטרינה	ציקדה ירוקה	0.1%		בהתאם לגודל העץ	
גפן	ציקדה ירוקה	0.1%		יש להקפיד על כיסוי מיטבי של כל חלקי העץ	30
גפן	קמחית הגפן		2 סמ"ק/גפן	60-120	
שקד	צרעת השקד ³ ציקדה ירוקה	0.1%		בהתאם לגודל העץ	3
				100 - 200 בהתאם לגודל העץ	90

¹ משך יעילות ההדברה ארוך יותר כאשר מרססים בריכוז הגבוה.

² יישום אחד בעונה בלבד ללא שלובים, בכל הגידולים למעט בשקד.

³ יישומים מופרש של שבועיים. מועד הריסוס הראשון ייקבע על ידי הערכת הגיחות של בוגרי צרעת השקד.

מפירות נגועים מן השנה הקודמת.

הערה כללית: הריסוס עלול לגרום לריבוי אקריות במטע.

שילובים: בהיעדר מידע נוסף, אין לשלב את התכשיר עם תכשירים אחרים.

