

זורבק אנדביה ת.ש.

כללי: זורבק אנדביה הינו תכשיר משולב למניעה והדברת מחלת הכמשון בתפוח אדמה, התכשיר מכיל חומר פעיל (oxathiapiprolin) בעל מנגנון פעולה חדשני, ללא עמידות צולבת עם תכשירים קיימים, ביחד עם חומר פעיל נוסף (benthiavalicarb-isopropyl). שני החומרים הפעילים סיסטמיים. שני החומרים הפעילים מקנים לתכשיר את יכולת מניעת ההדבקה, עצירת המחלה לאחר ההדבקה ופעילות ארדיקנטית לאחר התפתחות המחלה. התכשיר עמיד לשיטה כמחצית השעה לאחר הריסוס.

אזהרות: עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לדרכי הנשימה, עלול לגרום תגובה אלרגית בעור, חשוד כמסרטן.

אמצעי זהירות ומינון: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, עם שרולים ומכנס ארוך, נעלי עבודה סגורות או מגפי גומי, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. כפפות ניטריל או ניאופרן (לפי תקן EN-374/3) מסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן מסוג ABEK3 (תקן EN-14387) ומשקפי מגן (תקן EN-166). המנע ממגע עם העור והעניינים, המנע משאיפת או בליעת התכשיר. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס.

אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל ליצורים השוכנים במים עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. אין ליישם את התכשיר על מקורות מים.

מנע זרימת התכשיר ומי השטיפה למקורות מים, נחלים, מאגרים, ברכות דגים ושדות מעובדים. התכשיר אינו רעיל לדבורים.

הוראות שימוש: מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה, הפעל את מערכת הערבול, הוסף את כמות התכשיר המדודה והשלם את יתרת המים הדרושה. הקפד על ערבול מתמיד במהלך הריסוס. **חל איסור ליישם את התכשיר בציוד ריסוס דינ.**

| הגידול | המחלה | המינון - סמ"ק/ד' | נפח התרסיס (ליטר לדונם) | ריסוס אחרון ימים לפני קטיף |
|--------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| תפוח אדמה | כימשון | 40 | 15-50 (לפי גודל הנוף) | 7 ⁽¹⁾ |
| עגבנייה | | | 100 - 30 | 7 ⁽²⁾ |
| בצל | כשותית הבצל | 40 | 50 - 25 (לפי גודל הנוף) | 7 ⁽²⁾ |
| מלפפון | כשותית הדלועיים | 40 | 100 - 30 (לפי גודל הנוף) | 3 ⁽²⁾ |
| כרובית, כרוב | כשותית המצליבים | 40 | 60 - 30 (לפי גודל הנוף) | 7 ⁽²⁾ |
| חסה | כשותית החסה | 40 | 50 - 30 (לפי גודל הנוף) | 7 ⁽²⁾ |
| מלון | כשותית הדלועיים | 40 | 50 - 30 לפי גודל הנוף | 7 ⁽³⁾ |
| קשוא | | | | 7 ⁽²⁾ |
| חמצה | כשותית החמצה | 40 | 35 - 15 | 14 ⁽⁵⁾ |

(1) אין ליישם יותר מ-3 טיפולים בעונה. ולא יותר מ-2 ריסוסים רצופים במרווח של 7 ימים ביניהם ללא שילובים. יש להשתמש לחילופין עם קוטלי כימשון מקבוצות כימיות אחרות.



זורבק אנדביה 100 ת.ש. Zorvec Endavia™ 100 OD زوربك اندافيا

קוטל מחלות

תרחיף שמן (Oil Dispersion) קוטל אואומיצטים

מכיל: 30 גרם בליטר OXATHIPIPROLIN (קבוצה 49 לפי FRAC)
+ 70 גרם בליטר BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL (קבוצה 40 לפי FRAC)



התכשיר בדרגת רעילות III, מסוכן לבריאות.
מס' או"מ: 3082



קרא בעיון את התווית לפני השימוש!



מיועד לשימוש חקלאי בלבד - אסור לשימוש ביתי!
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي

רשיון השירותים להגנת הצומח מס' 21/ הצ/4589
התכשיר מיוצר ע"י חברת Corteva Agriscience
במפעליה: Cernay צרפת או Phyteurop צרפת

משווק ע"י חברת אגריכס בע"מ
ת.ד. 3154 פתח תקוה, טל: 03-9223785
www.farsis-agrichem.co.il



™ סימן רשום של חברת Corteva Agriscience

תאריך תפוגה:
מס' אצווה:

תאריך עידכון תווית: 7/2025
מכיל: 1/5 ליטר

זורבק אנדביה ת.ש.

- (2) יישום אחד ללא שילובים. אין ליישם תכשיר נוסף המכיל oxathiapiprolin.
- (3) 2 ריסוסים ללא שילובים. במרווח של 7 ימים ביניהם. אין ליישם תכשיר נוסף המכיל oxathiapiprolin.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס ואבזרי: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את הכלי וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הפיזור, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, איזוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה החלף בגדים, והתרחץ היטב במים וסבון. כבס בגדי עבודה בנפרד מיתר הכביסה.

מועד כניסה מחדש לשטח שטופל (REENTRY): 12 שעות.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר בארזיות המקוריות, סגורה, במקום נעול וקריר, הרחק ממקורות אש וחום, המיועד לאחסון תכשירי הדברה, הרחק ממוזונות אדם וחיה והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך או שפג תקופה או שהתלקק בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפניו לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך יש לספוג בחול או נסורת, לארוז במיכל אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול בארזיות ריקות: שטוף את הארזיה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את הארזיה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע החומר עם הגוף יש להסיר בגדים מזהמים, יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים וסבון. במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף את העיניים במים זורמים במשך כ-15 ד'. במקרה של שאיפת התכשיר העבר את הנפגע לאוויר צח. אם הנפגע אינו נושם קרא לרופא והנשם מלאכותית. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא עם תווית זו. אין לגרום להקאה ללא הנחייה מהרופא.

מידע לרופא: המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, חיפה טל': 04-7771900.

הערה: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית הארזיה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה על המוכר.